



Ferrugens da Cana-de-açúcar

MARROM e ALARANJADA
Igualmente Importantes

Sintomas

- **Lesões - em forma de pústulas**
 - ✓ Esporulação - parte inferior das folhas
- **Pústulas salientes**
 - ✓ Até próximo à bainha
- **Esporos de cor Laranja ou Marrom**
- **Áreas necrosadas**
 - ✓ Bordas e pontas de folhas















Diferenças das Ferrugens



Ferrugem Marrom



Ferrugem Alaranjada



Ferrugem Marrom

Ferrugem Alaranjada



Parede Espessa



“Bico Chato”

Controle

➤ Variedades resistentes



1

2

3

4


5

6

7

8

9



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0%

0.5%

1%

5%

10%

25%

35%

50%

>50%

Resistente

Intermediária

Suscetível

DINÂMICA DE VARIEDADES NO CENTRO-SUL DO BRASIL

➤ Diversificação de variedades



Controle Químico

Triazóis e misturas funcionam bem:

Produtos Registrados:

Alaranjada

Approach Prima, Priori Xtra, Opera, Evos, Nativo

Marrom

Priori Xtra, Opera, Evos

Quando Aplicar?

Aplicar com menos de 5% de severidade

Prof. Dr. Modesto Barreto

 (16) 99771-8371

 modesto@fcav.unesp.br

 modesto.barreto@agroalerta.com.br

<http://www.agroalerta.com.br>